MASCARILLA, FFP2

PRESENTACION: C/20 Uds. CARTON 20 x 20 Uds.

CARACTERISTICAS:

- Máscarilla facial filtrante, fabricada en fibra sintética no tejida hipoalergénica.
- Color: Blanco
- Un solo uso.
- Forma convexa.
- Lámina nasal para mejor ajuste.
- Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal.
- Modelo con valvula: Válvula de exhalación alta performance.
- No esteriles.

Cada tipo de estas mascarillas posee filtros con una eficacia de filtración mínima diferente frente a partículas en el aire (ya sean microorganismos, tóxicos, polen...). Las FFP1 ofrecen un 78% de eficacia, las FFP2 un 92% y las FFP3 un 98%.

Las mascarillas de papel son inútiles para limitar la transmisión del virus entre personas. En cambio, las mascarillas quirúrgicas son útiles para evitar que las personas infectadas por el coronavirus liberen gotitas con virus (saliva, mocos...) al aire al estornudar o toser. (FFP2).

La Organización Mundial para la Salud recomienda el uso para procedimientos de aislamiento o con posible generación de aerosoles infecciosos, un respirador con una eficiencia de filtración de al menos el 95% para partículas de 0,3 micras de diámetro. Lo que equivale a una mascarilla N95 según normativa americana NIOSH. Como la normativa Americana no equivale a la europea, este nivel de protección se queda de camino entre la FFP2 y FFP3.

Por lo tanto se recomienda el uso de los respiradores FFP-2 en las actividades con bajo o moderado riesgo, mientras que los respiradores FFP-3 se utilizarán en circunstancias donde el riesgo sea alto.

Pueden tener o no válvula de exhalación para reducir la humedad dentro de la mascarilla,

proporcionando una mayor comodidad al usuario, ofreciéndole además la sensación de una menor resistencia respiratoria. Las mascarillas con válvula no deben utilizarse en ambientes estériles.

Las mascarillas autofiltrantes deberán ser desechadas tras su utilización sino es posible mantenerlas en buenas condiciones higiénicas para su reutilización.

Clasificación de las actividades sanitarias en función del riesgo de exposición a agentes de transmisión aérea:

- *Actividades con riesgo bajo-moderado: entrar en habitaciones de aislamiento respiratorio, asistencia en urgencias y consultas a pacientes de alto riesgo de padecer enfermedades de transmisión aérea, laboratorios donde se procesen micobacterias (siempre que se trabaje en cabina de flujo laminar), son por lo tanto las recomendadas para prevenir el contagio en la población.*